




СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

СОФИЯ 1233, ул. „Враня“ № 20, тел. 8130 400, факс 831 21 29

www.srzi.bg, e-mail director@srzi.bg

ДО
ВСИЧКИ
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ



ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С писмо № 16-00-18/14.03.2017г. Министерство на здравеопазването разпорежда предприемането на превантивни мерки и насочване на вниманието на всички медицински специалисти към ранно откриване на симптоми на морбили, във връзка с усложнената епидемична обстановка в някои от страните на Европейския съюз, включително съседни на страната ни.

В периода от 1-ви ноември 2015г. до 31 октомври 2016г. държавите от ЕС са съобщили 3 037 случая на морбили, като при 72% от тях диагнозата е потвърдена лабораторно. С най-голям брой заболели са Румъния, Италия и Великобритания, в т.ч. и 7 смъртни случая – 6 от Румъния и 1 от Великобритания. От общо регистрираните случаи по възрастова структура 40% са деца под 5 години, а 29% над 20 години. Заболяемостта е най-висока при децата до 1 година и 1-4 годишна възраст.

От заболелите 81% са неимунизирани, 8% са имунизирани с 1 доза ваксина, 4% са имунизирани с две и повече дози и 7% са с неизвестен имунизационен статус. Най-много неваксинирани деца, 98% има сред кърмачетата, поради ненавършена възраст за имунизация, а най-голям брой с неизвестен статус при болни над 30г.

Към 03.03.2017г. са съобщени 3 196 случая на морбили в Румъния, в резултат от продължителното разпространение на заболяването в страната.

Във връзка с това, следва в спешен порядък да бъдат предприети следните мерки:

1. Всички лекари, работещи в лечебните заведения за болнична и доболнична помощ на територията на област София – град да изострят вниманието си към:
 - ранно откриване признаците на морбили: поне три от следните симптоми: повишена телесна температура, обрив, конюнктивит, кашлица;

- своевременно съобщаване на всеки съмнителен („възможен“) случай в Столична РЗИ (24 часа след откриването);
- навременна изолация, наблюдение и лечение;
- насочване за консултация с инфекционист;
- изследване:
 - изследване на серум (серологично) и урина (генетично) в лечебното заведение и изпращане на проби от същите клинични материали за препотвърждаване или отхвърляне на диагнозата в Националната референтна лаборатория (НРЛ) „Морбили, паротит, рубеола“ в НЦЗПБ или
 - директно изпращане на серума и урината в НРЛ за първично изследване.
- предприемане на противоепидемични мерки спрямо болния:
 - изолация;
 - хоспитализация;
 - лечение.
- предприемане на мерки спрямо контактните:
 - проверка на имунизационния статус;
 - при непълен имунизационен статус – изпращане на серум и урина в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“;
 - незабавна имунизация с 1 доза ваксина морбили-паротит-рубеола (МПР), след вземането на клиничния материал за изследване;
 - наблюдение;
 - при положителен за морбили лабораторен резултат – съобщаване на случая в СРЗИ в рамките на 24 часа.

2. Всеки общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на територията на област София – град трябва приоритетно да прегледа пациентските си листи относно имунизационния статус на всички свои пациенти на възраст от 13 месеца до 18 години, а именно:

2.1. Колко и кои са подлежащите на имунизация и реимунизация срещу морбили в посочения възрастов диапазон в съответната ОПЛ-практика, според Имунизационния календар (ИК) на страната;

2.2. Колко и кои от подлежащите по т. 2.1. са с пълен имунизационен статус за възрастта си – съответно – приели 1 доза ваксина МПР на 13 месечна възраст или приели 2 дози МПР на 12 годишна възраст;

2.3. Колко и кои от подлежащите по т. 2.1. не са обхванати с 1 или 2 дози ваксина МПР за възрастта си.

3. Всички неимунизирани или непълно имунизирани за възрастта си деца по точка 2.3. незабавно и с приоритет да бъдат обхванати от ОПЛ с 1 доза комбинирана ваксина МПР, като не се допускат случаи на необосновано отлагане на имунизацията. Отчитането на тази имунизация при деца, които са на възраст по-голяма от имунизационната по ИК, да става в ред: „Реимунзирани в други възрасти“, код 47.

В срок до 27.03.2017 г., всеки общопрактикуващ лекар да предостави подробна информация на районния епидемиолог в СРЗИ за предприетите мерки по горесцитираните точки, включително и като представи списък на лицата от 13 месеца до 18 години от неговата практика с името, датата на раждане, навършената възраст на детето и датите, на които е обхванато с имунизация с МПР (съответно с 1 или 2 приема).

С уважение,

Д-Р ДАЧО ПЕНЧЕВ

Директор на Столична регионална здравна инспекция

